

 Twee maatjes. Het baasje van Pajo vertelt: Eind augustus 2012 kreeg ik van de plaatselijke dierenarts te horen dat zij niets meer voor Pajo konden betekenen. Ik was ten einde raad. Een goede vriend heeft mij toen in contact gebracht met de dierenkliniek van Nico Dijkshoorn. Na  n bezoek werd al duidelijk dat mijn hondje een halshernia had. Nico Dijkshoorn heeft (met zijn team) mijn hondje via een nieuwe (zelf ontwikkelde) techniek vanaf de bovenzijde geopereerd. Met succes! Enkele dagen na de operatie kon ik mijn hondje weer ophalen uit de kliniek. Nico Dijkshoorn vertelde me dat er een wonder was gebeurd. De operatie is voor 100 % geslaagd. Wat ben ik blij dat ik mijn hondje nog heb dankzij de vakkundigheid van dierenkliniek Nico Dijkshoorn en zijn team. Bedankt namens Pajo en namens zijn baasje Frans Damen.

 Neurologisch onderzoek. De voorbereiding van Pajo's halsherniaoperatie  Neurologisch onderzoek van de gedeeltelijk verlamde hond (met ernstige pijn in de hals) toonde aan dat dit werd veroorzaakt door een hernia van de tussenwervelschijf tussen 2 halswervels.

 Myelografie (contrastonderzoek röntgenfoto ruggenmerg)    De exacte plaatsaanduiding van de hernia.  Vernauwing tussenwervelruimte. Via een "ruggenprik" is een contrastmiddel in het wervelkanaal gespoten. Een röntgenfoto werd gemaakt om de exacte plaatsaanduiding van de hernia te kunnen zien. Via dit contrastonderzoek (myelogram) is op de röntgenfoto duidelijk de vernauwing van de tussenwervelruimte zichtbaar (zie pijl) en op welke plaats het ruggenmerg door zijdelingse druk van de hernia ernstig in de knel zit (tussen 5de en 6de halswervel).

 Overzicht hals en hond  Operatie halshernia hond  Het ruggenmerg wordt beknelde, pijl 1.  Op het ruggenmerg drukkend tussenwervelschijfmateriaal is verwijderd, pijl 2.  Het verwijderde tussenwervelschijfmateriaal. Operatieve benadering via de bovenkant van de halswervelkolom is moeilijk vanwege het erg diep gelegen werkterrein. Door de zijkant van de twee aansluitende wervels weg te freezeen kon de chirurg.

het op het ruggenmerg drukkende tussenwervelschijfmateriaal (zie pijl 1), verwijderen (zichtbaar bij pijl 2). Duidelijk zichtbaar is hoe erg het ruggenmerg in de knel zit (pijl 1). Bij pijl 2 is het herniamateriaal verwijderd.

Weer bij elkaar!

Na de operatie van de halshernia liep de hond weer goed en kon pijnloos hoofd en hals goed bewegen. Dit was de tweede neurochirurgische operatie in

◆

week waarbij de halshernia via de benadering van de bovenkant moest plaatsvinden en succesvol verliep. Frans Damen en zijn kennissen de heer en mevrouw Koolen waren bijzonder blij en verrast door het snelle en succesvolle resultaat. Pajo is na drie dagen zonder klachten naar huis gegaan.

