


{comments off}Heeft uw hond zichtbaar problemen met lopen, of zelfs pijn? Veel honden krijgen te maken met heupdysplasie in de opbouwfase of op latere leeftijd klachten door heupdysplasie. Hier behandelen wij dagelijks de oorzaken en gevolgen van heupdysplasie, bij zowel jonge als oude honden. Naast medicatie, bewegingsaanpassing, gewichtsreductie bieden operaties (bv. standcorrectie bij beginnende heupdysplasie) perfecte mogelijkheden om het probleem heupdysplasie aan te pakken.

Heupdysplasie is een afwijking van het heupgewricht en komt zeer vaak voor in verschillende gradaties, variërend van slechte een aansluiting van heupkop/-kom tot en met ernstige artrose.



Oorzaak

Erfelijk, edoch milieufactoren als voeding, overgewicht, excessieve beweging tijdens de groeifase kunnen bevorderlijk zijn voor het tot uiting komen van H.D..

Diagnose

Naast een goed klinisch onderzoek is een correct uitgevoerd röntgenonderzoek is exacte juiste diagnose noodzakelijk voor een juist behandelplan.



Een scheef liggend bekken en niet goed ingedraaide koppen onder verdoving leiden tot slechte röntgenresultaten en een onjuist behandelplan.

[zie RONTGENTECHNIEK](#)

De Behandeling

De behandeling van H.D. is afgestemd op de ernst ervan.

- ✓ **Conservatieve behandeling**
- **Rechtlijnige beweging en spierbevorderende injecties, mogelijk gecombineerd met ontstekingsremmers en pijnstillers.**

- ✓ **Standcorrectie – Pectineus myectomie**
- **Standcorrectie van de achterbenen middels het verwijderen van een spier (musculus pectineus) aan de binnenzijde van het achterbeen is onze favoriete methode**

Met onze operatiemethode wordt de spier (musculus pectineus) niet doorgesneden maar in zijn totaliteit verwijderd vanaf het bekken tot aan de knie. Door de verbeterde stand drukken de krachten, de heupkop dieper de kom in, waardoor het heupgewricht beter functioneert en er minder/niet meer pijnlijk is. De hond loopt beter, krijgt een betere bespiering en het geheel zal een positief verloop krijgen.

Deze behandeling van heupdysplasie heeft uitstekende resultaten. Zowel bij opgroeiende honden met milde /ernstige HD, als ook oudere honden met reeds ernstige artrose. Technisch voor de hond niet ingrijpend, revalidatie zeer gemakkelijk. Mislukt nooit.

- ✓ **Bekkenkanteling**
- **Als standcorrectie middels voorgaande operatie niet haalbaar is. En liefst als het een eenzijdige heupdysplasie betreft. Risico voor hond, alsmede revalidatie, stuk zwaarder.**

Heupdysplasie (HD) is een deformerende heupkop t.g.v. Calve Leg Perthes
dysplasiae (CLP) die kan leiden tot een heupdysplasie (HD) die kan leiden tot een heupdysplasie (HD).